

Les communs



Geneviève Pelletier

Carouge à épaulettes

Agelaius phoeniceus

Taille : 22 cm

Habitat : marais et milieux ouverts

Mâle : corps entièrement noir avec une ligne rouge et jaune dans la partie supérieure de chacune de ses ailes

Femelle : corps brun avec plusieurs rayures sur la poitrine, un bec pointu et une ligne jaune pâle au-dessus de l'oeil

Le mâle défend un territoire de 600 à 1 200 m² en chantant sur le haut d'un perchoir

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant



Geneviève Pelletier

Vacher à tête brune

Molothrus ater

Taille : 18 cm

Habitat : champs, bordures des forêts, parcs et milieux ouverts

Mâle : corps entièrement noir avec la tête brune

Femelle : corps complètement brun-gris avec un bec gris foncé, très peu de rayures apparentes

Juvénile : corps brun avec une poitrine rayée de blanc

Oiseau parasite, car il pond dans les nids des autres espèces d'oiseaux, tels la paruline et le viréo, menaçant la survie de ces dernières.

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun



Geneviève Pelletier

Merle d'Amérique

Turdus migratorius

Taille : 25 cm

Habitat : très varié, forêts, milieux ouverts, parcs, pelouses et autres

Dessus gris foncé avec la poitrine rouge orangé, un bec jaune et du blanc sur le pourtour de l'oeil

Juvénile : même plumage, mais avec quelques rayures sur la poitrine

Le nid du merle est fait à partir d'herbe et de boue, disposé dans un arbuste, un arbre ou sur un bâtiment



Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Quiscale bronzé

Quiscalus quiscula

Taille : 30 cm

Habitat : parcs, milieux ouverts et agricoles

Corps noir avec des reflets violets sur la tête et parfois bronzés sur le dos et le ventre, longue queue arrondie et yeux jaunes

Alimentation : poissons, insectes, céréales, oiseaux, rongeurs et autres

En hiver, forme de grands groupes avec les carouges à épaulettes et les vachers à tête brune

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant



Geneviève Pelletier