


Les oiseaux aquatiques

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*

 : 83 cm

 : rivage, lac et rivière

© Jacques Gélinas



- Oiseau entièrement noir, peau de la gorge nue et orangée, possède une double huppe très peu visible et des yeux de couleur turquoise

© Jacques Gélinas




- Juvénile : poitrine et cou pâle
- Après avoir pêché, il se tient les ailes ouvertes pour les faire sécher
- Vole souvent en groupe tout en formant un V

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Plongeon huard *Gavia immer*

 : 70 à 90 cm

 : lac et rivage

- Été : tête noire, dos à motif de damier, bec fort, pointu et noir, collier incomplet rayé de noir et de blanc
- Hiver : dessus sombre avec dessous pâle
- Il peut plonger et rester jusqu'à 3 minutes sous l'eau pour échapper au danger




© Jacques Gélinas

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps*

 : 33 cm

 : lac et marais




© Jacques Gélinas

- Oiseau brun avec le dessous du croupion blanc, pieds lobés et pattes, ailes et queue courtes
- En été, une tache noire sous la gorge et un anneau noir est visible autour de son bec qui est épais et blanc
- Hiver : plus brun, sans tache à la gorge ni autour du bec

Statut et fréquence : nicheur migrateur peu commun

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

 : 33 cm

 : marais

- Dos brun, poitrine bleutée séparés par une ligne blanche, plaque frontale rouge et bec rouge avec l'extrémité jaune
- Marche sur les plantes aquatiques pour se nourrir d'herbes, de petits insectes et d'escargots



© Jacques Gélinas

Statut et fréquence : nicheur migrateur peu commun

Ressources naturelles
et Faune

Québec 