


Les autres oiseaux

Martin-pêcheur d'Amérique

Megasceryle alcyon

 : 33 cm

 : en bordure des cours d'eau et des lacs



© Jacques Gélinas


- Tête, ailes et dos gris-bleu, queue courte et bec long et pointu
- La femelle a une ceinture de couleur brun-roux
- Le nid se trouve au bout d'un tunnel ayant une longueur entre 90 cm et 4,5 m qui est creusé dans un talus de sable

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Pipit d'Amérique

Anthus rubescens

 : 15 à 18 cm

 : zones dégagées et rivages



© Jacques Gélinas


- Oiseau gris au ventre chamois rayé, sourcils jaunes pâles, pattes habituellement noires ou brunes foncées et les côtés de sa queue sont blancs et visibles en vol
- S'observe en couple ou en petits groupes
- Hoche la queue en marchant tout en se nourrissant d'insectes, d'herbes et de graines

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Jaseur d'Amérique

Bombcilla cedrorum

 : 18 cm

 : forêts clairsemées et arbres fruitiers



© Jacques Gélinas

- Manteau brun avec un masque noir, ventre jaune, huppe brune, bande jaune au bout de la queue et pointes rouges sur quelques plumes des ailes
- Oiseau vivant en groupe
- Il mange surtout des insectes, des baies et des fruits sauvages

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Hirondelle bicolor

Tachycineta bicolor

 : 13 à 15 cm

 : zones dégagées, marais et pré



© Jacques Gélinas

- Dos bleu avec des reflets verts et un dessous blanc
- Jeune : dos brun foncé
- Se nourrit d'insectes qu'elle attrape au vol et peut parfois manger également des baies
- Niche dans les cavités d'arbres morts et dans les nichoirs

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Autres oiseaux pouvant être aperçus sur le site : hirondelle rustique, merle d'Amérique, étourneau sansonnet, geai bleu, vacher à tête brune, quiscalpe bronzé, carouge à épaulettes et colibri à gorge rubis

Ressources naturelles
et Faune

Québec 