

# Les bruants

## Bruant à gorge blanche

*Zonotrichia albicollis*

 : 17 cm

 : buissons et près du sol dans les forêts



© Geneviève Pelletier

- Poitrine grise avec une couronne foncée dont la bande centrale est jaune claire ou blanche, gorge blanche, bec noirâtre et tache jaune entre le bec et l'oeil



© Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

## Bruant chanteur

*Melospiza melodia*

 : 15 cm

 : buissons, zones dégagées et marais



© Jacques Gélinas

- Poitrine fortement rayée avec une tache au centre et une calotte brun-roux avec un trait central gris
- En vol, agite la queue de haut en bas
- Les mâles revendiquent leur territoire de 2 500 à 7 500 m<sup>2</sup> en chantant sur un perchoir
- Après la 1<sup>ère</sup> couvée, la femelle entame une 2<sup>è</sup> nichée

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

## Bruant des marais

*Melospiza georgiana*

 : 13 à 14 cm

 : buissons et marais



© Jacques Gélinas


- Bruant brun-roux, gorge blanche, ailes et calotte rousses, joues grises et il peut avoir de fines rayures sur la poitrine
- En période de reproduction, le mâle peut chanter tant de jour que de nuit

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

## Junco ardoisé

*Junco hyemalis*

 : 14 à 17 cm

 : forêts, bords de la route et dans les buissons



© J Gélinas 2007

- Manteau gris-ardoise, bec et ventre blancs, présence de plumes blanches de chaque côté de la queue
- Femelle et jeune : dos plus terne
- L'hiver, il se tient en groupe qui comporte toujours les mêmes individus et où ils y sont hiérarchisés

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Autres bruants pouvant être aperçus sur le site : bruant de Lincoln et bruant des neiges

Ressources naturelles  
et Faune

Québec 