

# Les familiers

## Pic flamboyant *Colaptes auratus*

 : 30 à 35 cm

 : forêt et buissons



© Jacques Gélinas

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

- Dos brun, couronne grise, collier noir et nuque rouge
- Mâle : possède une moustache noire
- En vol, croupion blanc très visible et le dessous de sa queue et de ses ailes sont jaune dorée
- Il se nourrit souvent de fourmis qu'il capture au sol

## Pic mineur *Picoides pubescens*

 : 16 cm

 : forêt et buissons



Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur résidant commun

- Dos blanc, petit bec, ailes noires tachetées de blanc
- Mâle : tache rouge derrière la tête
- La longueur du bec équivaut à moins de la moitié de celle de la tête
- Les narines de tous les pics sont cachées par des plumes pour limiter l'entrée de poudre et de copeaux de bois

## Sittelle à poitrine blanche *Sitta carolinensis*

 : 13 à 15 cm

 : forêt et buissons





Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur sédentaire commun

- Petit oiseau possédant un manteau bleu, une poitrine blanche, un capuchon noir et qui a le visage entièrement blanc
- Descend les troncs la tête en bas
- A l'habitude de ranger sa nourriture dans les crevasses de l'écorce des arbres

## Mésange à tête noire *Poecile atricapillus*

 : 12 à 14 cm

 : forêt et buissons de saule



Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur résidant abondant

- Manteau gris avec des flancs chamois, des joues blanches, une gorge et un capuchon noirs
- Mange des baies, des insectes et des graines
- Au printemps, les mâles chantent et le couple défend son territoire de nidification

Autres oiseaux pouvant être aperçus sur le site : pic chevelu et grimpeur brun

Ressources naturelles  
et Faune

Québec 