


Les laridés

Mouette de Bonaparte

Chroicocephalus philadelphia

 : 33 cm

 : rivage et lac



© Jacques Gélinas


- Manteau gris, poitrine blanche, capuchon noir, pattes rouges et longues pointes blanches au bout des ailes
- Hiver : capuchon disparaît, mais une tache noire reste au niveau de l'oreille
- Se nourrit souvent avec les sternes

Statut et fréquence : migrateur de passage et estivant peu commun

Goéland à bec cerclé

Larus delawarensis

 : 48 cm

 : rivage, champs labourés et lac



Geneviève Pelletier


- Manteau gris, tête et poitrine blanches, cercle noir autour du bec, pattes jaunes ou vertes et beaucoup de noir sous les plumes des ailes
- Les goélands qui vivent près des restaurants rapides sont souvent des goélands à bec cerclé

Statut et fréquence : nicheur migrateur abondant

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

 : 48 à 58 cm

 : rivages de grands plans d'eau



© Jacques Gélinas


- Manteau gris, dessous blanc, gros bec rouge et huppe et calotte noires
- En vol, extrémité du dessous des ailes est foncée
- Hiver : calotte grise et moins bien définie
- Lorsqu'elle pêche, elle vole à la surface de l'eau

Statut et fréquence : estivant et migrateur de passage rare

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

 : 33 à 40 cm

 : lac et plage



© Jacques Gélinas

- Manteau gris pâle, bec rouge-orangé à bout noir, calotte noire, poitrine blanche, queue fourchue et pattes rouge-orangé
- Les jeunes et les adultes en hiver ont une calotte noire incomplète et un bec noirâtre
- Le mâle, en période de reproduction, vole avec un poisson dans le bec

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Autres laridés pouvant être aperçus sur le site : mouette pygmée, goéland argenté, goéland marin et guifette noire

Ressources naturelles
et Faune

Québec 