



Les limicoles

Pluvier semipalmé

Charadrius semipalmatus

 : 16 à 18 cm

 : rivage et plage



© Jacques Gélinas


- Plumage du dos brun avec poitrine blanche et un seul collier noir
- Bec jaune à bout noir ou tout noir en hiver
- Pour se nourrir, il court, s'arrête, saisit une proie et reprend sa course
- Pour faire sortir les proies enfouies, il fait vibrer l'une de ses pattes sur le sol

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Pluvier kildir

Charadrius vociferus

 : 25 cm

 : champ, pelouse et rivage



Geneviève Pelletier

- Manteau brun foncé sur le dessus et blanc en dessous, avec deux colliers noirs
- En vol, dévoile un croupion roux avec une queue plutôt longue et une bande blanche sur l'aile
- Afin d'éloigner le danger de son nid ou de ses petits, il feint une aile cassée





Geneviève Pelletier

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

 : 26 à 34 cm

 : marais et plage




© Jacques Gélinas


- Été : poitrine noire et dos clair moucheté
- Hiver : juvénile et adulte semblables, plumage du dos gris moucheté de blanc avec un dessous pâle
- En vol, ses "aisselles" sont noires et sa queue et son croupion sont blancs
- Se nourrit de crustacés, de mollusques et d'insectes

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Tournepièce à collier

Arenaria interpres

 : 20 à 25 cm

 : plage



© Jacques Gélinas

- Dos roux avec des motifs noirs et blancs dans le visage et des pattes orangées
- Le plumage d'hiver des adultes et celui des jeunes sont bruns avec un dessous blanc. Quelques motifs sont présents dans le visage
- Trouve sa nourriture en cherchant sous les algues, les cailloux, la terre et les coquillages avec son bec

Statut et fréquence : migrateur de passage peu commun

Autres limicoles pouvant être aperçus sur le site : pluvier bronzé, bécasseau mabèche, bécassine de Wilson, bécassin roux et bécasseau variable