

Les limicoles

Grand chevalier *Tringa melanoleuca*

 : 35 cm

 : marais et cours d'eau




© Jacques Gélinas

- Longues pattes jaunes vives avec articulations fortes et un long bec qui est légèrement retroussé
- En vol, croupion et queue blanchâtres
- Été : cou et tête portent de minces rayures noires et ses flancs sont barrés de noir
- Fait des mouvements de balayage avec son bec dans l'eau pour capturer poissons, insectes, vers et gastéropodes

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Petit chevalier *Tringa flavipes*

 : 25 à 28 cm

 : Marais et rivage





© Jacques Gélinas

- Fines pattes jaunes, bec bien droit, fines rayures noires au cou et flancs légèrement barrés noirs
- Hiver : dessus gris, les rayures du cou et des flancs sont moins apparentes qu'en été
- Mange des poissons, des vers, des insectes, des gastéropodes et des baies qu'il recherche dans les eaux peu profondes

Statut et fréquence : nicheur migrateur commun

Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*

 : 14 à 16 cm

 : plage

- Dos brun-gris avec une poitrine blanche, des flancs faiblement rayés et des pattes généralement noires




© Jacques Gélinas

- Mange la tête baissée en attrapant des crustacés, des mollusques et des insectes aquatiques d'un geste brusque sur les étendues de sable et de boue

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Bécasseau minuscule *Calidris minutilla*

 : 13 à 16 cm

 : marais et rivage

- Plumage brun rayé sur le dos, poitrine brunâtre et striée, pattes jaunes ou vertes et bec mince et court



© Jacques Gélinas

- Hiver : dessus grisâtre
- Se nourrit près du rivage dans les milieux boueux et herbeux où il y mange des mollusques, des vers et des crustacés

Statut et fréquence : migrateur de passage commun

Autres limicoles pouvant être aperçus sur le site : chevalier grivelé, bécasseau sanderling, bécasseau à croupion blanc et bécasseau à poitrine cendrée