

Mammifères

Parmi les espèces mammaliennes en péril pouvant se rencontrer au lac Saint-Pierre, nous retrouvons quatre chauves-souris et deux micromammifères (tableau 04). Vu la difficulté d'observer ces dernières espèces, nous considérons qu'elles sont présentes dans le secteur, toujours selon leurs cartes de répartition (BURT *et al.* 1992) et selon une étude de la Fondation de la faune du Québec et de NOVE Environnement Inc., 2001. Toutefois, une étude effectuée par GDG Environnement a permis la capture d'un spécimen de campagnol sylvestre. Sa présence est donc confirmée sur le territoire (Maisonneuve *et al.* 1994).

Liste des espèces de mammifères en péril susceptibles de se rencontrer sur le territoire du lac Saint-Pierre et de son archipel

Nom français	Nom latin	Statut au Québec	Statut au Canada
Campagnol-lemming de Cooper	<i>Synaptomys cooperi</i>	Susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé	
Campagnol sylvestre	<i>Microtus pinetorum</i>		Préoccupant
Chauve-souris argentée	<i>Lasionycteris noctivagans</i>	Susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé	
Chauve-souris cendrée	<i>Lasiurus cinereus</i>	Susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé	
Chauve-souris rousse	<i>Lasiurus borealis</i>	Susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé	
Pipistrelle de l'est	<i>Pipistrellus subflavus</i>	Susceptible d'être désigné vulnérable ou menacé	

Campagnol-lemming de Cooper *Synaptomys cooperi*

Le campagnol-lemming de Cooper est un petit mammifère, au même titre que les souris. Son pelage est brun clair sur le dos et argenté sur l'abdomen. Le campagnol-lemming adulte mesure environ 12 cm de longueur et pèse en moyenne 28 g. Ses incisives sont marquées d'une rayure longitudinale. L'espèce se distingue du campagnol des champs par sa queue plus courte. Le campagnol-lemming *cooperi* fréquente les tourbières, les marais herbeux et les forêts mixtes humides. Il se nourrit d'herbes et de laïches, de baies, de champignons souterrains, d'écorces, de racines et parfois d'insectes (coléoptères) et d'escargots.



©Ressources Naturelles et faune du Québec

Chauve-souris cendrée *Lasiurus cinereus*

La chauve-souris cendrée compte parmi l'une des trois espèces de chauves-souris migratrices du Québec. Avec une masse entre 25 et 35 g, elle est la plus grande espèce de chauve-souris au Canada. Son pelage est brun, et chacun de ses poils se termine par du blanc cendré. Sa gorge est quant à elle jaune.

Elle habite en général les régions boisées et semi-boisées et chasse principalement les papillons de nuit au-dessus des clairières et des plans d'eau. Durant l'été, elle utilise les arbres comme lieu de repos. L'automne venu, elle migre vers le sud des États-Unis et les Caraïbes, où elle passe l'hiver.



©Ressources Naturelles et faune du Québec

©M.Brock