

Oiseaux

Le territoire du lac Saint-Pierre et de son archipel est un milieu riche en faune aviaire. On a pu y observer jusqu'à maintenant 291 espèces d'oiseaux, dont 131 qui utilisent le secteur comme site de nidification et 41 autres qui l'utilisent possiblement comme nidification. Parmi les espèces nicheuses, neuf espèces possèdent des statuts d'espèces en péril au Québec et/ou au Canada. On retrouve le bruant de Nelson, le hibou des marais, le martinet ramoneur, le pic à tête rouge, la pie-grièche migratrice, le goglu des prés, la paruline du Canada, l'engoulevent d'Amérique ainsi que le troglodyte à bec court.

Quatorze autres espèces possédant un statut en péril ont été observées, depuis 1998, dans le secteur du lac Saint-Pierre et de son archipel. Voici quelques espèces qui ont été observées : la grèbe esclavon qui est désigné menacé au Québec et en voie de disparition au Canada et le bécasseau maubèche sous espèce rufa étant susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec et en voie de disparition au Canada.

Liste des oiseaux en péril susceptibles d'être aperçus au lac Saint-Pierre et son archipel.

Nom français	Nom latin	Nidification au LSP	Statut au Québec	Statut au Canada
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>		Vulnérable	
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>		Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	En voie de disparition
Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>		Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	En voie de disparition
Engoulevent bois-pourri	<i>Caprimulgus vociferus</i>		Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Menacé
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Menacé
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Possible nidification	Vulnérable	Préoccupant

Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>		Vulnérable	Préoccupant
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Confirmé		Menacé
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>		Menacé	En voie de disparition
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Préoccupant
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Menacé
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>		Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Menacé
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Menacé
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Possible nidification	Vulnérable	Menacé
Pic à tête rouge	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>	Confirmé	Menacé	Menacé
Pie-grièche migratrice	<i>Lanius ludovicianus</i>	Confirmé	Menacé	En voie de disparition
Pluvier siffleur	<i>Charadrius melodus</i>		Menacé	En voie de disparition
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>		Vulnérable	
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>		Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	Préoccupant
Râle jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>		Menacé	Préoccupant

Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	Possible nidification	Menacé	
Troglodyte à bec court	<i>Cistothorus platensis</i>	Confirmé	Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable	

Source : Dion et al. 1988, Environnement Canada (site Internet : Atlas de la Biodiversité du Saint-Laurent) ; GAUTHIER et al. 1996.

HIBOU DES MARAIS



Asio flammeus

C'est une rapace surtout nocturne, il est un hibou de lieux découverts, chassant souvent le jour. Se reconnaît à son plumage brun chamois rayé et son vol inégal et paresseux. De grandes taches alaires chamois et une tache noire sous le «poignet» sont visibles en vol.

©PETERSON, Roger Tory. *Le guide des oiseaux du Québec et de l'est de l'Amérique du nord*, Broquet, 1999. P.385

PETIT BLONGIOS

Ixobrychus exilis

Le petit blongios (*Ixobrychus exilis*), autrefois connu sous le nom de petit butor, est un petit échassier au même titre que le grand héron (*Ardea herodias*). Cet oiseau est donc très effilé, avec de longues pattes et un long cou. La calotte et le dos, noirs chez le mâle et plus pâles chez la femelle, contrastent avec le corps chamois.

Le petit blongios niche dans des marais et des marécages d'eau douce dominés par des plantes aquatiques émergentes, particulièrement les quenouilles (*Typha spp.*), ainsi que par des arbustes et des zones d'eau libre. Il affectionne particulièrement les milieux humides où le niveau de l'eau varie peu durant l'été (marais aménagés, marais lacustres).

Dans l'ensemble de son territoire, la perte d'habitats de nidification en raison de la destruction des milieux humides est la plus importante menace qui pèse sur le petit blongios.

©Ressources naturelles et faune du Québec



RÂLE JAUNE



COTURNICOPS NOVEBORACENSIS

Petit râle chamois ; on dirait un poussin d'une semaine. Cette espèce a un bec très court de couleur verdâtre. Son dos est rayé et carrelé de chamois et noir. Son comportement est semblable à celui d'une souris dans le sens où le râle jaune a de la difficulté à se faire lever. Noter bien sa tache blanche de l'aile lorsqu'il est en vol.

©PETERSON, Roger Tory. *Le guide des oiseaux du Québec et de l'est de l'Amérique du nord*, Broquet, 1999. P.385